

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Генерального директора
Департамента лекарственного
обеспечения и медицинской техники
Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики

Джусупова Дж. Дж.

«28» сентября 20 16 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ФУРАСОЛ

Регистрационный номер: _____

Торговое название

Фурасол

Международное непатентованное название (МНН)

Нет

Лекарственная форма

Порошок для приготовления раствора для наружного применения 100 мг

Состав

Один пакетик содержит

Активное вещество: фуразидин калия 100,0 мг;

Вспомогательное вещество– натрия хлорид 900,0 мг.

Масса содержимого одного пакетика 1000 мг.

Описание

Крупный порошок оранжевато-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептики и дезинфицирующие препараты. Производные нитрофурана.

Код АТХ D08AF

Фармакологические свойства

Фуразидин калия – противомикробное средство, производное нитрофурана. Эффективен в отношении грамположительных кокков (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*), грамотрицательных палочек (*E. coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*). Устойчивы *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus spp.*, *Acinetobacter spp.*, большинство штаммов *Proteus spp.*, *Serratia spp.* Механизм действия связан с ингибированием синтеза нуклеиновых кислот. В зависимости от концентрации оказывает бактерицидное или бактериостатическое действие.

Против большей части бактерий бактериостатическая концентрация составляет от 10-20 мкг/мл. Бактерицидная концентрация примерно в 2 раза выше. Под влиянием нитрофуранов в микроорганизмах происходит подавление активности дыхательной цепи и цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса), а также угнетение других биохимических процессов, что приводит к разрушению их оболочки или цитоплазматической мембраны.

Нитрофураны повышают титр комплемента и способность лейкоцитов фагоцитировать микроорганизмы.

Показания к применению

Для наружного применения при комплексном лечении инфекционно-воспалительных заболеваний

- полости рта
- ротоглотки
- инфицированных ран (кожи и слизистых оболочек).

Способ применения и дозы

Для наружного применения.

Раствор готовят непосредственно перед применением. Содержимое пакетика растворяют в стакане (200 мл) горячей воды и теплый раствор используют для полоскания полости рта и ротоглотки 2-3 раза в день.

Раствор препарата также применяют для промывания ран. После хирургической обработки наносят раствор непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку, или на перевязочный материал, а затем на рану. Наносить на раневую поверхность 2-3 раза в день.

Побочные действия

- кожные аллергические реакции

Противопоказания

- повышенная чувствительность к фуразидину калия или препаратам нитрофуранового ряда
- аллергический дерматит
- беременность и период лактации
- детский возраст до 4-х лет

Лекарственные взаимодействия

В сочетании с антибиотиками проявляет синергизм (совместное действие).

В случае употребления алкоголя во время лечения препаратом, возрастает вероятность развития кожных аллергических реакций.

Особые указания

Меры предосторожности

В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций. В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу.

Раствор готовят непосредственно перед применением.

Приготовленный раствор не хранить.

Применение в педиатрии

Не применять для полоскания полости рта и горла детям младше 4-х лет, так как ребенок еще не умеет полоскать полость рта и горло.

Особенности влияния на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Препарат не оказывает влияние на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Передозировка

Не выявлена

Меры предосторожности

Раствор окрашивает кожу в желтый цвет.

Форма выпуска и упаковка

По 1000,0 мг порошка в пакетики из ламината.

По 15 пакетиков из ламината вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

5 лет

Не применять после истечения срока годности

Условия отпуска

Без рецепта

Производитель

АО «Олайнфарм».

Адрес: ул. Рупницу 5, Олайне, LV-2114, Латвия